

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1992 年登録症例

1/2

15

| | | | | |
|-------|------|--------|----------------|---------|
| 移植時日齢 | 最小 | 185.0 | 移植前検査 | |
| | 最大 | 1070.0 | 総ビリルビン (mg/dl) | |
| | 平均 | 529.5 | 最小 | 0.0 |
| | 標準偏差 | 295.6 | 最大 | 0.0 |
| 移植時体重 | 最小 | 6.00 | 平均 | #DIV/0! |
| | 最大 | 13.0 | 標準偏差 | #DIV/0! |
| | 平均 | 8.7 | ALT (IU/l) | |
| | 標準偏差 | 2.2 | 最小 | 0 |
| 移植時身長 | 最小 | 60.0 | 最大 | 0 |
| | 最大 | 104.0 | 平均 | #DIV/0! |
| | 平均 | 73.1 | 標準偏差 | #DIV/0! |
| | 標準偏差 | 13.7 | γ G T P (IU/l) | |
| 移植方法 | 全肝 | 1 | 最小 | 0 |
| | 部分肝 | 12 | 最大 | 0 |
| | 不明 | 2 | 平均 | #DIV/0! |
| | 同所性 | 6 | 標準偏差 | #DIV/0! |
| | 異所性 | 0 | C h E (IU/l) | |
| | 不明 | 9 | 正常範囲未満 | 0 |
| 臓器提供者 | | | 正常範囲以上 | 0 |
| 脳死体 | 3 | | 不明 | 15 |
| 生体 | 10 | | ALP (IU/l) | |
| 生体の場合 | 父 | 4 | 正常範囲未満 | 0 |
| | 母 | 5 | 正常範囲以上 | 0 |
| | 血縁者 | 0 | 不明 | 15 |
| | 非血縁者 | 1 | | |
| | 記載なし | 1 | | |
| 不明 | 2 | | | |

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1992年登録症例

2/2

15

| 移植前食道静脈瘤の有無 | | その他続発性合併症 | | 免疫抑制剤の種類 | | |
|------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|------------|-------|
| あり | 4 | 肝性昏睡 | 0 | サイクロスポリン | 3 | |
| なし | 4 | 腹水 | 6 | タクロリムス | 11 | |
| | 治療あり | 2 | 腸瘻 | 6 | アザチオプリン | 2 |
| | 治療なし | 2 | 呼吸障害 | 3 | ステロイド | 10 |
| 治療ありの場合 (治療内容は重複あり) | 内視鏡的治療 | 2 | 消化管出血 | 6 | その他 | 1 |
| | 直達手術 | 0 | 骨折 | 1 | | |
| | シャント手術 | 0 | 22 症例 (重複あり) | | (重複有り) | |
| | その他 | 0 | その他の詳細 | | 肝移植手術症例の経過 | |
| | 治療不明 | 0 | 成長発育障害 | 0 | 転帰 | 生存 13 |
| 不明 | 7 | 胆管炎 | 0 | | 死亡 | 2 |
| 移植前脾機能亢進症の有無 | あり | 3 | 肝肺症候群 | 0 | 不明 | 0 |
| | | | 肝内嚢胞 | 0 | 移植後何日目死亡 | |
| | なし | 8 | 肝腫瘍 | 0 | 最小 | 12 |
| | | | 肺高血圧症 | 0 | 最大 | 2436 |
| | | 治療あり | 0 | 感染 | 1 | 平均 |
| 治療なし | | 4 | 掻痒 | 0 | 標準偏差 | 1361 |
| 治療ありの場合 (治療内容は重複あり) | 部分的脾動脈塞栓術 | 0 | イレウス | 0 | | |
| | 摘脾 | 0 | I T P | 0 | | |
| | その他 | 0 | 肝腎症候群 | 0 | | |
| | 治療不明 | 0 | その他 | 6 | | |
| 検査せず | 4 | 7 症例 (重複あり) | | | | |