

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1996 年登録症例

1/2

37

移植時日齢	最小	210.0	移植前検査	
	最大	2847.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	734.6	最小	4.4
	標準偏差	675.1	最大	44.2
移植時体重	最小	5.53	平均	19.5
	最大	18.0	標準偏差	17.9
	平均	9.2	ALT (IU/l)	
	標準偏差	3.8	最小	18
移植時身長	最小	59.0	最大	557
	最大	106.8	平均	305.8
	平均	74.2	標準偏差	278.3
	標準偏差	14.1	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	40
	部分肝	35	最大	534
	不明	2	平均	245.0
	同所性	15	標準偏差	217.0
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	22	正常範囲未満	2
臓器提供者			正常範囲以上	1
脳死体	1		不明	34
生体	35		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	16	正常範囲未満	0
	母	17	正常範囲以上	4
	血縁者	0	不明	33
	非血縁者	1		
	記載なし	2		
不明	1			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1996年登録症例

2/2

37

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	7	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	2	
なし	10	腹水	20	タクロリムス	33	
	治療あり	3	腸瘻	3	アザチオプリン	3
	治療なし	4	呼吸障害	1	ステロイド	28
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	3	消化管出血	6	その他	1
	直達手術	0	骨折	0		
	シャント手術	0	31 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 34
不明	20		胆管炎	3		死亡 3
			肝肺症候群	0		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	12		肝腫瘍	0	最小	4
なし	19		肺高血圧症	0	最大	2645
	治療あり	0	感染	0	平均	1050
	治療なし	12	掻痒	0	標準偏差	1406
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	イレウス	0		
	摘脾	0	I T P	0		
	その他	0	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	6		9 症例 (重複あり)			