

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1997 年登録症例

1/2

41

移植時日齢	最小	218.0	移植前検査	
	最大	3125.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	867.9	最小	2.4
	標準偏差	828.1	最大	7.3
移植時体重	最小	4.30	平均	5.1
	最大	25.5	標準偏差	2.5
	平均	10.5	ALT (IU/l)	
	標準偏差	5.2	最小	65
移植時身長	最小	60.0	最大	90
	最大	115.1	平均	80.7
	平均	78.4	標準偏差	13.7
	標準偏差	15.2	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	32
	部分肝	40	最大	154
	不明	1	平均	86.0
	同所性	16	標準偏差	62.2
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	25	正常範囲未満	3
臓器提供者			正常範囲以上	0
脳死体	0		不明	38
生体	40		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	16	正常範囲未満	0
	母	23	正常範囲以上	3
	血縁者	0	不明	38
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	1			

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1997年登録症例

2/2

41

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	16	肝性昏睡	2	サイクロスポリン	2		
なし	11	腹水	19	タクロリムス	33		
	治療あり	10	腸瘻	2	アザチオプリン	1	
	治療なし	6	呼吸障害	2	ステロイド	22	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	9	消化管出血	11	その他	4	
	直達手術	0	骨折	2			
	シャント手術	0	38 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 36	
不明	14		胆管炎	3		死亡 4	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	15	肝肺症候群	0		不明 1	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	22	肝腫瘍	0	最小	4	
		治療あり	1	肺高血圧症	0	最大	730
				治療なし	13	感染	0
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	搔痒	0	標準偏差 342		
	摘脾	0	イレウス	1			
	その他	1	I T P	0			
	治療不明	1	肝腎症候群	0			
検査せず	4		その他	6			
				10 症例 (重複あり)			