

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1998 年登録症例

1/2

49

移植時日齢	最小	135.0	移植前検査	
	最大	3131.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	957.4	最小	1.5
	標準偏差	802.4	最大	31.3
移植時体重	最小	5.37	平均	11.9
	最大	25.0	標準偏差	13.1
	平均	10.9	ALT (IU/l)	
	標準偏差	4.6	最小	24
移植時身長	最小	42.0	最大	191
	最大	126.0	平均	122.0
	平均	80.4	標準偏差	61.8
	標準偏差	18.2	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	62
	部分肝	49	最大	350
	不明	0	平均	212.8
	同所性	33	標準偏差	107.0
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	16	正常範囲未満	5
臓器提供者			正常範囲以上	1
脳死体	0		不明	43
生体	49		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	19	正常範囲未満	0
	母	25	正常範囲以上	6
	血縁者	2	不明	43
	非血縁者	0		
	記載なし	3		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1998年登録症例

2/2

49

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	17	肝性昏睡	0	サイクロスポリン	1		
なし	24	腹水	17	タクロリムス	45		
	治療あり	8	腸瘻	3	アザチオプリン	1	
	治療なし	9	呼吸障害	2	ステロイド	28	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	6	消化管出血	10	その他	3	
	直達手術	0	骨折	5			
	シャント手術	0	37 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	2	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 45	
不明	8	胆管炎	1		死亡	3	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	24	肝肺症候群	1	不明	1	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	22	肝腫瘍	0	最小	6	
			肺高血圧症	0	最大	389	
		治療あり	4	感染	1	平均	143
治療なし		20	掻痒	0	標準偏差	214	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	4	イレウス	0			
	摘脾	0	I T P	0			
	その他	0	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	3	9 症例 (重複あり)					