

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2000 年登録症例

1/2

48

移植時日齢	最小	172.0	移植前検査	
	最大	4211.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	924.2	最小	0.5
	標準偏差	1031.7	最大	48.8
移植時体重	最小	4.80	平均	12.0
	最大	35.0	標準偏差	11.0
	平均	10.7	ALT (IU/l)	
	標準偏差	7.5	最小	14
移植時身長	最小	43.6	最大	685
	最大	153.0	平均	139.4
	平均	76.5	標準偏差	120.7
	標準偏差	25.9	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	1	最小	27
	部分肝	47	最大	1496
	不明	0	平均	399.3
	同所性	46	標準偏差	386.1
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	2	正常範囲未満	33
臓器提供者			正常範囲以上	8
脳死体	1		不明	7
生体	47		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	12	正常範囲未満	1
	母	30	正常範囲以上	41
	血縁者	2	不明	6
	非血縁者	0		
	記載なし	3		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2000年登録症例

2/2

48

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	18	肝性昏睡	3	サイクロスポリン	2	
なし	13	腹水	18	タクロリムス	40	
	治療あり	9	腸瘻	0	アザチオプリン	0
	治療なし	9	呼吸障害	3	ステロイド	27
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	8	消化管出血	10	その他	7
	直達手術	0	骨折	1		
	シャント手術	0	35 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 42
不明	17		胆管炎	1		死亡 6
			肝肺症候群	2		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	1	移植後何日目死亡	
あり	24		肝腫瘍	0	最小	10
なし	23		肺高血圧症	0	最大	210
	治療あり	3	感染	0	平均	72
	治療なし	20	掻痒	0	標準偏差	81
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	2	イレウス	0		
	摘脾	0	I T P	0		
	その他	1	肝腎症候群	0		
	治療不明	1	その他	6		
検査せず	1		10 症例 (重複あり)			