

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2002 年登録症例

1/2

67

移植時日齢	最小	127.0	移植前検査	
	最大	4384.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	884.8	最小	0.5
	標準偏差	1016.0	最大	44.8
移植時体重	最小	5.73	平均	12.5
	最大	43.2	標準偏差	11.2
	平均	12.2	ALT (IU/l)	
	標準偏差	9.0	最小	15
移植時身長	最小	53.0	最大	961
	最大	151.0	平均	131.5
	平均	83.0	標準偏差	137.7
	標準偏差	24.8	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	21
	部分肝	64	最大	1760
	不明	3	平均	291.8
	同所性	58	標準偏差	304.1
	異所性	2	C h E (IU/l)	
	不明	7	正常範囲未満	46
臓器提供者			正常範囲以上	16
脳死体	1		不明	5
生体	65		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	23	正常範囲未満	0
	母	37	正常範囲以上	62
	血縁者	4	不明	5
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	1			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2002 年登録症例

2/2

67

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	24	肝性昏睡	3	サイクロスポリン	2		
なし	11	腹水	27	タクロリムス	57		
	治療あり	11	腸瘻	0	アザチオプリン	1	
	治療なし	12	呼吸障害	5	ステロイド	39	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	11	消化管出血	7	その他	12	
	直達手術	1	骨折	3			
	シャント手術	0	45 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	1	成長発育障害	0	転帰	生存 57	
不明	32		胆管炎	4		死亡 8	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	31	肝肺症候群	1		不明 2	
			肝内嚢胞	1	移植後何日目死亡		
	なし	23	肝腫瘍	0	最小	6	
		治療あり	3	肺高血圧症	0	最大	96
		治療なし	27	感染	1	平均	31
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	3	掻痒	0	標準偏差 30		
	摘脾	0	イレウス	0			
	その他	0	I T P	0			
	治療不明	1	肝腎症候群	0			
検査せず	13		その他	6			
				13 症例 (重複あり)			