

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2003 年登録症例

1/2

63

移植時日齢	最小	153.0	移植前検査	
	最大	5194.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1308.2	最小	0.3
	標準偏差	1342.5	最大	47.2
移植時体重	最小	4.83	平均	12.2
	最大	31.0	標準偏差	11.0
	平均	12.5	ALT (IU/l)	
	標準偏差	7.4	最小	31
移植時身長	最小	54.6	最大	625
	最大	135.5	平均	139.0
	平均	84.1	標準偏差	105.9
	標準偏差	23.0	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	1	最小	18
	部分肝	59	最大	2251
	不明	3	平均	343.0
	同所性	59	標準偏差	348.9
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	4	正常範囲未満	42
臓器提供者			正常範囲以上	10
脳死体	2		不明	11
生体	59		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	22	正常範囲未満	1
	母	33	正常範囲以上	56
	血縁者	2	不明	6
	非血縁者	0		
	記載なし	2		
不明	2			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2003 年登録症例

2/2

63

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	29	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	8		
なし	9	腹水	22	タクロリムス	51		
	治療あり	19	腸瘻	3	アザチオプリン	0	
	治療なし	10	呼吸障害	4	ステロイド	36	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	18	消化管出血	13	その他	10	
	直達手術	0	骨折	3			
	シャント手術	0	46 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	2	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 58	
不明	25		胆管炎	1		死亡 4	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	29	肝肺症候群	2		不明 1	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	28	肝腫瘍	0	最小	12	
		治療あり	7	肺高血圧症	0	最大	218
				治療なし	20	感染	1
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	5	搔痒	3	標準偏差	93	
	摘脾	1	イレウス	0			
	その他	1	I T P	0			
	治療不明	2	肝腎症候群	0			
検査せず	6		その他	6			
				13 症例 (重複あり)			