

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2004 年登録症例

1/2

48

移植時日齢	最小	118.0	移植前検査	
	最大	5469.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1293.2	最小	0.6
	標準偏差	1545.6	最大	48.2
移植時体重	最小	4.02	平均	12.0
	最大	43.0	標準偏差	10.4
	平均	13.7	ALT (IU/l)	
	標準偏差	10.7	最小	16
移植時身長	最小	57.2	最大	814
	最大	160.0	平均	142.0
	平均	85.4	標準偏差	137.6
	標準偏差	28.9	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	23
	部分肝	47	最大	1985
	不明	1	平均	371.5
	同所性	44	標準偏差	403.8
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	4	正常範囲未満	32
臓器提供者			正常範囲以上	10
脳死体	0		不明	6
生体	47		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	14	正常範囲未満	4
	母	28	正常範囲以上	40
	血縁者	4	不明	4
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	1			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2004 年登録症例

2/2

48

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	14	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	0		
なし	9	腹水	20	タクロリムス	45		
	治療あり	6	腸瘻	1	アザチオプリン	2	
	治療なし	8	呼吸障害	2	ステロイド	28	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	4	消化管出血	6	その他		
	直達手術	0	骨折	2			
	シャント手術	2	32 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 46	
不明	25		胆管炎	3		死亡 2	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	23	肝肺症候群	2		不明 0	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	18	肝腫瘍	0	最小	137	
		治療あり	2	肺高血圧症	1	最大	187
		治療なし	20	感染	0	平均	162
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	搔痒	0	標準偏差 35		
	摘脾	0	イレウス	0			
	その他	1	I T P	0			
	治療不明	1	肝腎症候群	0			
検査せず	7		その他	6			
				12 症例 (重複あり)			