

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2006 年登録症例

1/2

48

移植時日齢	最小	176.0	移植前検査	
	最大	6114.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1820.3	最小	0.4
	標準偏差	1920.7	最大	30.1
移植時体重	最小	4.60	平均	8.9
	最大	57.8	標準偏差	7.3
	平均	17.6	ALT (IU/l)	
	標準偏差	14.9	最小	12
移植時身長	最小	55.0	最大	405
	最大	160.5	平均	106.1
	平均	97.4	標準偏差	72.7
	標準偏差	36.2	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	18
	部分肝	47	最大	1345
	不明	1	平均	343.4
	同所性	42	標準偏差	307.5
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	6	正常範囲未満	35
臓器提供者			正常範囲以上	8
脳死体	0		不明	5
生体	48		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	22	正常範囲未満	1
	母	25	正常範囲以上	46
	血縁者	1	不明	1
	非血縁者	0		
	記載なし	0		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2006年登録症例

2/2

48

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	25	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	4		
なし	6	腹水	16	タクロリムス	43		
	治療あり	11	腸瘻	1	アザチオプリン	0	
	治療なし	13	呼吸障害	7	ステロイド	26	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	7	消化管出血	7	その他	5	
	直達手術	0	骨折	0			
	シャント手術	0	32 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	4	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	1	成長発育障害	0	転帰	生存 45	
不明	17	胆管炎	1			死亡 2	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	23	肝肺症候群	0		不明 1	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	16	肝腫瘍	0	最小	25	
		治療あり	2	肺高血圧症	1	最大	151
		治療なし	21	感染	1	平均	88
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	2	搔痒	0	標準偏差 89		
	摘脾	0	イレウス	0			
	その他	0	I T P	1			
	治療不明	0	肝腎症候群	1			
検査せず	9		その他	6			
				11 症例 (重複あり)			