

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2008 年登録症例

1/2

53

移植時日齢	最小	149.0	移植前検査	
	最大	5389.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1216.8	最小	0.1
	標準偏差	1421.3	最大	33.3
移植時体重	最小	5.69	平均	10.5
	最大	54.0	標準偏差	10.1
	平均	15.4	ALT (IU/l)	
	標準偏差	12.1	最小	11
移植時身長	最小	60.0	最大	4392
	最大	160.0	平均	203.3
	平均	90.0	標準偏差	597.7
	標準偏差	30.2	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	10
	部分肝	53	最大	2157
	不明	0	平均	328.3
	同所性	49	標準偏差	352.4
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	4	正常範囲未満	31
臓器提供者			正常範囲以上	20
脳死体	0		不明	2
生体	53		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	19	正常範囲未満	0
	母	30	正常範囲以上	51
	血縁者	3	不明	2
	非血縁者	1		
	記載なし	0		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2008年登録症例

2/2

53

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	18	肝性昏睡	0	サイクロスポリン	3	
なし	10	腹水	21	タクロリムス	50	
	治療あり	5	腸瘻	0	アザチオプリン	0
	治療なし	13	呼吸障害	4	ステロイド	32
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	5	消化管出血	3	その他	13
	直達手術	0	骨折	2		
	シャント手術	0	30 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 52
不明	25		胆管炎	3		死亡 1
			肝肺症候群	1		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	21		肝腫瘍	0	最小	200
なし	27		肺高血圧症	0	最大	200
	治療あり	3	感染	0	平均	200
	治療なし	18	掻痒	0	標準偏差	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	1	イレウス	0		
	摘脾	2	I T P	0		
	その他	0	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	5		10 症例 (重複あり)			