

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2010 年登録症例

1/2

66

移植時日齢	最小	133.0	移植前検査	
	最大	7383.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1371.5	最小	0.3
	標準偏差	1897.3	最大	56.1
移植時体重	最小	4.62	平均	12.1
	最大	70.0	標準偏差	12.0
	平均	15.8	ALT (IU/l)	
	標準偏差	15.5	最小	16
移植時身長	最小	56.4	最大	638
	最大	173.0	平均	142.4
	平均	88.7	標準偏差	128.6
	標準偏差	35.7	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	3	最小	20
	部分肝	57	最大	2074
	不明	6	平均	291.1
	同所性	54	標準偏差	347.3
	異所性	1	C h E (IU/l)	
	不明	11	正常範囲未満	49
臓器提供者			正常範囲以上	13
脳死体	0		不明	4
生体	66		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	28	正常範囲未満	2
	母	33	正常範囲以上	59
	血縁者	4	不明	5
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2010年登録症例

2/2

66

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	22	肝性昏睡	1	サイクロスポリン	3		
なし	13	腹水	25	タクロリムス	62		
	治療あり	12	腸瘻	1	アザチオプリン	0	
	治療なし	10	呼吸障害	4	ステロイド	39	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	11	消化管出血	10	その他	15	
	直達手術	0	骨折	0			
	シャント手術	0	41 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 65	
不明	31		胆管炎	1		死亡 1	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	32	肝肺症候群	1		不明 0	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	22	肝腫瘍	0	最小	140	
			肺高血圧症	1	最大	140	
		治療あり	0	感染	0	平均	140
		治療なし	33	掻痒	0	標準偏差	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	イレウス	0			
	摘脾	0	I T P	0			
	その他	0	肝腎症候群	0			
	治療不明	0	その他	6			
検査せず	12		9 症例 (重複あり)				