

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2012 年登録症例

1/2

68

移植時日齢	最小	61.0	移植前検査	
	最大	8088.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1502.1	最小	0.4
	標準偏差	2013.7	最大	96.0
移植時体重	最小	4.30	平均	10.7
	最大	60.2	標準偏差	15.1
	平均	15.7	ALT (IU/l)	
	標準偏差	14.4	最小	15
移植時身長	最小	47.2	最大	1208
	最大	170.8	平均	163.2
	平均	91.2	標準偏差	234.1
	標準偏差	36.0	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	1	最小	19
	部分肝	64	最大	2038
	不明	3	平均	278.3
	同所性	58	標準偏差	353.7
	異所性	1	C h E (IU/l)	
	不明	9	正常範囲未満	42
臓器提供者			正常範囲以上	19
脳死体	1		不明	7
生体	67		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	25	正常範囲未満	4
	母	36	正常範囲以上	58
	血縁者	5	不明	6
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2012年登録症例

2/2

68

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	25	肝性昏睡	2	サイクロスポリン	5		
なし	11	腹水	20	タクロリムス	58		
	治療あり	10	腸瘻	1	アザチオプリン	0	
	治療なし	15	呼吸障害	8	ステロイド	47	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	10	消化管出血	9	その他	27	
	直達手術	0	骨折	0			
	シャント手術	0	40 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 61	
不明	32		胆管炎	3		死亡 5	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	29	肝肺症候群	2		不明 1	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	28	肝腫瘍	0	最小	10	
		治療あり	6	肺高血圧症	0	最大	410
				感染	0	平均	138
	治療なし	22	搔痒	1	標準偏差	172	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	4	イレウス	0			
	摘脾	1	I T P	0			
	その他	1	肝腎症候群	0			
	治療不明	1	その他	7			
検査せず	11		13 症例 (重複あり)				