

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2013 年登録症例

1/2

50

移植時日齢	最小	123.0	移植前検査	
	最大	8242.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1169.5	最小	0.4
	標準偏差	1907.2	最大	41.5
移植時体重	最小	3.98	平均	9.8
	最大	60.0	標準偏差	9.4
	平均	13.2	ALT (IU/l)	
	標準偏差	13.3	最小	20
移植時身長	最小	51.0	最大	833
	最大	166.3	平均	178.0
	平均	83.9	標準偏差	161.5
	標準偏差	29.9	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	33
	部分肝	45	最大	898
	不明	5	平均	301.1
	同所性	38	標準偏差	232.1
	異所性	2	C h E (IU/l)	
	不明	10	正常範囲未満	35
臓器提供者			正常範囲以上	9
脳死体	0		不明	6
生体	47		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	17	正常範囲未満	2
	母	25	正常範囲以上	46
	血縁者	4	不明	2
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	3			

# 胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2013年登録症例

2/2

50

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	13	肝性昏睡	2	サイクロスポリン	4		
なし	13	腹水	17	タクロリムス	43		
	治療あり	4	腸瘻	0	アザチオプリン	0	
	治療なし	9	呼吸障害	5	ステロイド	19	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	4	消化管出血	5	その他	9	
	直達手術	0	骨折	1			
	シャント手術	0	30 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	0	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 48	
不明	24		胆管炎	4		死亡 1	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	19	肝肺症候群	1		不明 1	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	22	肝腫瘍	0	最小	172	
		治療あり	0	肺高血圧症	0	最大	172
		治療なし	19	感染	1	平均	172
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	0	掻痒	0	標準偏差		
	摘脾	0	イレウス	0			
	その他	0	I T P	0			
	治療不明	0	肝腎症候群	0			
検査せず	9		その他	6			
				12 症例 (重複あり)			