

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2016 年登録症例

1/2

71

移植時日齢	最小	118.0	移植前検査	
	最大	9343.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1801.0	最小	0.2
	標準偏差	2463.5	最大	28.9
移植時体重	最小	3.23	平均	9.1
	最大	96.0	標準偏差	7.6
	平均	18.8	ALT (IU/l)	
	標準偏差	19.1	最小	12
移植時身長	最小	52.5	最大	1045
	最大	177.0	平均	136.8
	平均	93.9	標準偏差	150.7
	標準偏差	38.1	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	14
	部分肝	70	最大	1249
	不明	1	平均	295.0
	同所性	66	標準偏差	274.1
	異所性	0	C h E (IU/l)	
	不明	5	正常範囲未満	46
臓器提供者			正常範囲以上	22
脳死体	0		不明	3
生体	71		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	30	正常範囲未満	1
	母	36	正常範囲以上	65
	血縁者	4	不明	5
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2016年登録症例

2/2

71

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類		
あり	25	肝性昏睡	0	サイクロスポリン	7	
なし	17	腹水	15	タクロリムス	63	
	治療あり	16	腸瘻	1	アザチオプリン	0
	治療なし	9	呼吸障害	9	ステロイド	40
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	14	消化管出血	9	その他	14
	直達手術	0	骨折	0		
	シャント手術	1	34 症例 (重複あり)		(重複有り)	
	その他	1	その他の詳細		肝移植手術症例の経過	
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 69
不明	29		胆管炎	6		死亡 2
			肝肺症候群	3		不明 0
移植前脾機能亢進症の有無			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡	
あり	26		肝腫瘍	0	最小	80
なし	37		肺高血圧症	0	最大	80
	治療あり	8	感染	0	平均	80
	治療なし	18	掻痒	0	標準偏差	0
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	5	イレウス	0		
	摘脾	2	I T P	0		
	その他	1	肝腎症候群	0		
	治療不明	0	その他	6		
検査せず	8		15 症例 (重複あり)			