

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2017 年登録症例

1/2

60

移植時日齢	最小	145.0	移植前検査	
	最大	9560.0	総ビリルビン (mg/dl)	
	平均	1875.1	最小	0.5
	標準偏差	2925.2	最大	42.0
移植時体重	最小	5.04	平均	10.0
	最大	72.0	標準偏差	9.4
	平均	19.4	ALT (IU/l)	
	標準偏差	19.1	最小	14
移植時身長	最小	56.0	最大	384
	最大	172.8	平均	114.9
	平均	94.1	標準偏差	82.6
	標準偏差	40.4	γ G T P (IU/l)	
移植方法	全肝	0	最小	21
	部分肝	59	最大	2507
	不明	1	平均	422.0
	同所性	54	標準偏差	519.2
	異所性	3	C h E (IU/l)	
	不明	3	正常範囲未満	46
臓器提供者			正常範囲以上	8
脳死体	0		不明	6
生体	60		ALP (IU/l)	
生体の場合	父	20	正常範囲未満	3
	母	35	正常範囲以上	52
	血縁者	4	不明	5
	非血縁者	0		
	記載なし	1		
不明	0			

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2017年登録症例

2/2

60

移植前食道静脈瘤の有無		その他続発性合併症		免疫抑制剤の種類			
あり	20	肝性昏睡	3	サイクロスポリン	11		
なし	11	腹水	19	タクロリムス	47		
	治療あり	12	腸痙	1	アザチオプリン	0	
	治療なし	8	呼吸障害	5	ステロイド	31	
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	内視鏡的治療	10	消化管出血	8	その他	18	
	直達手術	0	骨折	1			
	シャント手術	0	37 症例 (重複あり)		(重複有り)		
	その他	2	その他の詳細		肝移植手術症例の経過		
	治療不明	0	成長発育障害	0	転帰	生存 58	
不明	29		胆管炎	2		死亡 1	
移植前脾機能亢進症の有無	あり	28	肝肺症候群	1		不明 1	
			肝内嚢胞	0	移植後何日目死亡		
	なし	24	肝腫瘍	0	最小	1038	
		治療あり	8	肺高血圧症	1	最大	1038
		治療なし	19	感染	1	平均	1038
治療ありの場合 (治療内容は重複あり)	部分的脾動脈塞栓術	2	搔痒	0	標準偏差		
	摘脾	4	イレウス	0			
	その他	2	I T P	0			
	治療不明	1	肝腎症候群	0			
検査せず	8		その他	6			
			11 症例 (重複あり)				