胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1995～2016年登録症例（1999年以降登録　1038 例）

1313

移植施設	
慶応義塾大学	47
弘前大学	12
国立成育医療センター	113
国立病院機構岡山医療センター	3
国立岡山病院	2
三重大学	11
山口大学	2
自治医科大学	159
鹿児島大学	1
順天堂大学	17
信州大学	32
新潟大学	3
神奈川県立こども医療センター	32
岡山大学	30
大阪市立大学	3
大阪大学	65
筑波大学	21
長崎大学	5
東京医科大学	4
東京女子医科大学	13
東京大学	37
東北大学	40
藤田保健衛生大学	14
奈良県立医科大学	4
日本医科大学	2
福島医科大学	9
兵庫医科大学	4
北海道大学	25
北里大学	6
名古屋市立大学	17
名古屋大学	55
獨協医科大学	2
愛媛大学	4
京都大学	354
京都府立医科大学	7
金沢医科大学	11
金沢大学	1
群馬大学	2

移植時日齢	
最小	61.0
最大	9343.0
平均	1150.7
標準偏差	1536.9

移植時体重	
最小	3.05
最大	96.0
平均	13.2
標準偏差	11.7

移植時身長	
最小	11.4
最大	174.5
平均	83.8
標準偏差	28.3

移植方法	
全肝	20
部分肝	1239
不明	54
同所性	1037
異所性	7
不明	269

臓器提供者	
脳死体	24
生体	1263

父	502
母	678
血縁者	49
非血縁者	3
記載なし	31
不明	26

移植前検査（1999～）	
総ビリルビン（mg/dl）	
最小	0.10
最大	96.00
平均	10.92
標準偏差	10.19
ALT(IU/l)	
最小	0.00
最大	4392.00
平均	147.41
標準偏差	196.57
γGTP(IU/l)	
最小	0.00
最大	3312.00
平均	320.24
標準偏差	340.40
ChE(IU/l)	
正常範囲未満	712
正常範囲以上	220
不明	106
ALP(IU/l)	
正常範囲未満	22
正常範囲以上	933
不明	83

移植前食道静脈瘤の有無		
あり	444	
なし	256	
治療ありの場合（治療内容は重複あり）	治療あり	210
	治療なし	227
	内視鏡的治療	192
	直達手術	1
	シャント手術	2
	その他	17
	治療不明	7
不明	513	

移植前脾機能亢進症の有無		
あり	516	
なし	534	
治療ありの場合	治療あり	54
	治療なし	453
	部分的脾動脈塞栓術	35
	摘脾	12
	その他	7
	治療不明	9
検査せず	163	

その他続発性合併症	
肝性昏睡	30
腹水	460
腸瘻	21
呼吸障害	87
消化管出血	183
骨折	31
812 症例（重複）	

その他の詳細	
成長発育障害	7
胆管炎	57
肝肺症候群	24
肝内嚢胞	4
肝腫瘍	0
肺高血圧症	7
感染	6
掻痒	7
イレウス	3
ＩＴＰ	3
肝腎症候群	1
その他	1
120 症例（重複あり）	

免疫抑制剤の種類	
サイクロスポリン	82
タクロリムス	1067
アザチオプリン	18
ステロイド	713
その他	170
（重複有り）	

肝移植手術症例の経過		
転帰	生存	1208
	死亡	89
	不明	16

移植後何日目死亡	
最小	1
最大	4836
平均	400
標準偏差	903

岩手医科大学	1
熊本大学	72
九州大学	34
徳島大学	1
オーストラリア	4
ブラジル	1
ブリスベン王立病院	11
台湾	1
マイアミ大	1
ロイヤルチルドレン	1
空欄	17
合　計	1313