

胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

1995～2016年登録症例（1999年以降登録 1038例）

1313

移植施設	移植時年齢	最小	61.0	移植前検査 (1999～)	移植前食道静脈瘤の有無	その他続発性合併症	免疫抑制剤の種類
慶応義塾大学	47	最大	9343.0	総ビリルビン (mg/dl)	あり	444	肝性昏睡 30 サイクロスポリン 82
弘前大学	12	平均	1150.7	最小 0.10	なし	256	腹水 460 タクロリムス 1067
国立成育医療センター	113	標準偏差	1536.9	最大 96.00	治療あり	210	腸痙 21 アザチオプリン 18
国立病院岡山医療センター	3	移植時体重	最小 3.05	平均 10.92	治療なし	227	呼吸障害 87 ステロイド 713
国立岡山病院	2	最大	96.0	標準偏差 10.19	治療ありの 場合 (治療内容は重複あり)	192	消化管出血 183 その他 170
三重大学	11	平均	13.2	ALT(IU/l)	内視鏡的治療	1	骨折 31
山口大学	2	標準偏差	11.7	最小 0.00	直達手術	2	812 症例 (重複有り)
自治医科大学	159	移植時身長	最小 11.4	最大 4392.00	シャント手術	2	その他の詳細
鹿児島大学	1	最大	174.5	平均 147.41	その他	17	肝移植手術症例の経過
順天堂大学	17	平均	83.8	標準偏差 196.57	不明	513	成長発育障害 7 転帰 生存 1208
信州大学	32	標準偏差	28.3	γGT P(IU/l)	不明	513	胆管炎 57 死亡 89
新潟大学	3	移植方法	全肝 20	最小 0.00	移植前脾機能亢進症の有無		不明 16
伊豆田島立こども医療センター	32	部分肝	1239	最大 3312.00	あり	516	肝内膿瘍 4 移植後何日目死亡
岡山大学	30	不明	54	平均 320.24	なし	534	肝腫瘍 0 最小 1
大阪市立大学	3	同所性	1037	標準偏差 340.40	治療あり	54	肺高血圧症 7 最大 4836
大阪大学	65	異所性	7	Ch E(IU/l)	治療なし	453	感染 6 平均 400
筑波大学	21	不明	269	正常範囲未満 712	治療ありの場合	35	播種 7 標準偏差 903
長崎大学	5	臓器提供者	正常範囲以上 220	不明 106	部分的脾動脈結紮	12	イレウス 3
東京医科大学	4	脳死体	24	ALP(IU/l)	摘脾	9	ITP 3
東京女子医科大学	13	生体	1263	正常範囲以上 933	不明	7	肝腎症候群 1
東京大学	37	父	502	正常範囲未満 22	検査せず	163	その他 1
東北大学	40	母	678	正常範囲以上 933			120 症例 (重複あり)
藤田保健衛生大学	14	血縁者	49	不明 83			
奈良県立医科大学	4	非血縁者	3				
日本医科大学	2	記載なし	31				
福島医科大学	9	不明	26				
兵庫医科大学	4						
北海道大学	25	岩手医科大学	1				
北里大学	6	熊本大学	72				
名古屋市立大学	17	九州大学	34				
名古屋大学	55	徳島大学	1				
獨協医科大学	2	オーストラリア	4				
愛媛大学	4	ブラジル	1				
京都大学	354	ブリスベン王立病院	11				
京都府立医科大学	7	台湾	1				
金沢医科大学	11	マイアミ大	1				
金沢大学	1	ロイヤルチルドレン	1				
群馬大学	2	空欄	17				
合計			1313				