胆道閉鎖症全国登録集計〈移植例〉

2016 年登録症例

55

移植施設	
慶応義塾大学	5
弘前大学	0
国立成育医療センター	15
国立病院岡山医療センター	0
国立岡山病院	0
三重大学	0
山口大学	0
自治医科大学	4
鹿児島大学	0
順天堂大学	1
信州大学	0
新潟大学	0
神奈川県立こども医療センター	2
岡山大学	1
大阪市立大学	0
大阪大学	3
筑波大学	0
長崎大学	0
東京医科大学	0
東京女子医科大学	0
東京大学	0
東北大学	0
藤田保健衛生大学	1
奈良県立医科大学	0
日本医科大学	0
福島医科大学	0
兵庫医科大学	0
北海道大学	0
北里大学	0
名古屋市立大学	0
名古屋大学	7
獨協医科大学	0
愛媛大学	0
京都大学	4
京都府立医科大学	2
金沢医科大学	0
金沢大学	0
群馬大学	0
合　　計	

移植時日齢		
最小	118.0	
最大	9343.0	
平均	1153.7	
標準偏差	1948.5	
移植時体重		
最小	3.23	
最大	96.0	
平均	14.8	
標準偏差	17.7	
移植時身長		
最小	52.5	
最大	160.7	
平均	81.9	
標準偏差	29.7	
移植方法		
全肝	0	
部分肝	54	
不明	1	
同所性	50	
異所性	0	
不明	5	
臓器提供者		
脳死体	0	
生体	55	
生体の場合		
父	24	
母	30	
血縁者	1	
非血縁者	0	
記載なし	0	
不明	0	

岩手医科大学	0
熊本大学	5
九州大学	2
徳島大学	0
オーストラリア	0
ブラジル	0
ブリスベン王立病院	0
台湾	0
マイアミ大	0
ロイヤルチルドレン	0
空欄	3

移植前検査	
総ビリルビン（mg/dl）	
最小	0.2
最大	28.9
平均	10.0
標準偏差	7.8
ALT(IU/l)	
最小	12.0
最大	1045.0
平均	141.5
標準偏差	162.1
γGTP(IU/l)	
最小	14.0
最大	1249.0
平均	311.1
標準偏差	293.2
ChE(IU/l)	
正常範囲未満	36
正常範囲以上	18
不明	1
ALP(IU/l)	
正常範囲未満	0
正常範囲以上	52
不明	3

移植前食道静脈瘤の有無		
あり	17	
なし	11	
	治療あり	8
	治療なし	9
治療ありの場合（治療内容は重複あり）	内視鏡的治療	7
	直達手術	0
	シャント手術	0
	その他	1
	治療不明	0
不明	27	

移植前脾機能亢進症の有無		
あり	17	
なし	31	
	治療あり	5
	治療なし	12
治療ありの場合（治療内容は重複あり）	部分的脾動脈塞栓術	3
	摘脾	2
	その他	0
	治療不明	0
検査せず	7	

その他続発性合併症		
肝性昏睡	0	
腹水	15	
腸重	1	
呼吸障害	8	
消化管出血	7	
骨折	0	
31 症例（重複あり）		
その他の詳細		
成長発育障害	0	
胆管炎	5	
肝肺症候群	3	
肝内嚢胞	0	
肝腫瘍	0	
肺高血圧症	0	
感染	0	
痙攣	0	
イレウス	0	
ITP	0	
肝腎症候群	0	
その他	6	
14 症例（重複あり）		

免疫抑制剤の種類	
サイクロスポリン	5
タクロリムス	50
アザチオプリン	0
ステロイド	33
その他	13
（重複有り）	
肝移植手術症例の経	
転帰 生存	55
死亡	0
不明	0
移植後何日目死亡	
最小	0
最大	0
平均	0
標準偏差	